

La poiana

Scritto da Gianluca Paoni



La **Poiana** è un rapace di medie dimensioni. Appare come un rapace massiccio e un po' tozzo (lunghezza: 55 cm.). La colorazione generale tende al bruno scuro, ma il petto è pesantemente macchiettato di chiaro. E' evidente una lunetta più scura sul collo, che sembra quasi un "collarino". La quantità di bruno e bianco è molto variabile e non è difficile vedere individui scurissimi ed altri quasi bianchi. Le zampe e la base del becco (cera) sono gialli. Durante il volo planato, tipico mentre volteggia, appare con coda a ventaglio e ali larghe (ap. alare 125 cm.); inoltre in volo si distingue grazie al contrasto della parte interna dell'ala più scura con quella esterna più chiara (contrastante con le lunghe penne della "mano", ossia dell'estremità dell'ala). E' molto difficile distinguere i giovani dagli adulti grazie al piumaggio, ma se l'animale è abbastanza vicino, l'iride dell'occhio dei giovani è più chiara rispetto agli adulti. I due sessi non presentano differenze evidenti. Esistono poche specie simili alla **Poiana** in Europa, ma sono tutte abbastanza rare. L'unica frequente in Europa è il Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), che si distingue per la sagoma generale più

allungata e per la testa e il collo piccoli, lunghi e grigiastri.

Il tipico verso che si associa ai rapaci normalmente, è proprio quello della **Poiana**. Questo consiste in un alto e lamentoso "Piuu-piuu-uuu".

La **Poiana** frequenta ambienti molto vari: per la nidificazione preferisce **boschi** di modeste dimensioni circondati da vaste aree aperte dove cacciare. Per quanto riguarda l'altitudine si trova dal piano fino ai 1900 m. s.l.m, ma è più frequente sopra i 500 m. s.l.m. In inverno spesso si può contattare in aree totalmente prive di boschi, in zone umide e in aree urbane.

L'osservazione non presenta particolari difficoltà, ma spesso può avvenire quando l'animale è in volo, magari molto in alto.

La stagione riproduttiva della **Poiana** inizia solitamente a inizio Marzo con spettacolari parate nuziali. Dopo la costruzione del nido (una piattaforma voluminosa di rami) vengono deposte dalle 2 alle 4 uova. Queste sono bianche o macchiettate di bruno (dim.: 55x45 mm). Vengono covate sia dal maschio, che dalla femmina per circa 35 gg. I nidiacei sono nidicoli e ricoperti di piumino, vengono allevati al nido per circa 50 gg. e dopo l'involo (quando escono dal nido e sotto capaci di volare) vengono ancora seguiti e nutriti dai genitori altri 50 gg. Durante l'inverno la **Poiana** è il rapace più diffuso in pianura e

collina e in Italia, solitamente, gli individui nidificanti sono stanziali. A questi si aggiungono, però, altri animali provenienti dall'Europa centro-meridionale.

La **Poiana** è un migratore regolare, ma compie spostamenti molto più brevi, che vengono distribuiti maggiormente nel tempo e nello spazio.

La **Poiana** è un uccello predatore, che preferisce cacciare micromammiferi come le arvicole o più raramente conigli selvatici e lepri. A volte può predare anche altri uccelli, anfibi, rettili e molto di rado pesci e insetti. Caccia all'agguato o sorvolando da molto in alto i territori di caccia.

Una curiosità: in natura non è difficile osservare questo rapace inseguito da gruppi di corvidi (come Cornacchie e Gazze), che non tollerano la presenza di predatori nel proprio territorio e perciò li infastidiscono fino a farli volar via. Questo comportamento è detto mobbing e deriva dall'inglese to mob "infastidire".