

La coturnice

Scritto da Gianluca Paoni



La **coturnice** è lunga circa 35cm, per un peso di 500/850 grammi.

Ha un corpo tozzo, coda corta e ali lunghe circa 16-17cm.

Il ventre è giallastro, le zampe e il becco sono rosse.

La gola, le guance e la parte anteriore del corpo sono bianche, contornate da una evidente fascia nera ben marcata che arriva fino alla fronte. Il resto del piumaggio è in prevalenza

grigio-azzurro con riflessi rossicci. La

coturnice possiede un volo fragoroso e rapido con frequenti battute d'ala e lunghe planate; corre sul terreno quando è disturbata e si alza in volo solo se si sente minacciata da vicino.

La **Coturnice** è un animale diurno. Facile da riconoscere è pure il canto, particolarmente intenso durante il periodo primaverile quando il maschio lo utilizza per delimitare il suo territorio e richiamare una femmina per formare la coppia, in maggio.

La **coturnice** è un uccello di medie dimensioni che non mostra un dimorfismo sessuale. La

coturnice corre con grande rapidità sul terreno e, rispetto ad altre specie simili, presenta un volo rettilineo, rapido e silenzioso. Sul finire dell'autunno, le **coturnici** si radunano in folli branchi, che si disperdono all'inizio della stagione degli amori.

Durante il periodo riproduttivo le **coturnici** si trovano al di sopra del limite del [bosco](#) mentre nel periodo invernale possono anche abbassarsi ad altitudini di 700 - 800 m. In questi casi vengono prediletti spazi aperti con zona verdi e non è quindi raro incontrarle nei dintorni di monti o nei pressi di ruscelli. In generale la **coturnice** ritorna comunque nelle zone di altitudine appena la neve scompare.

La **Coturnice** è stanziale, vive in pendii soleggiati e pietrosi con scarsa vegetazione e cespugli isolati di zone collinari e montane, si spinge fino ad altitudini di 2500 metri. La **coturnice** si ciba di sostanze vegetali e d'invertebrati come ragni, coleotteri e larve. In alta montagna ricerca gemme di rododendri e di altri arbusti alpini, diverse qualità di bacche e di semi, erbe e germogli.

Il corteggiamento inizia in aprile. Il maschio canta e si esibisce per attrarre la femmina. Il nido, è ben nascosto nella sterpaglia, esso consiste in una leggera depressione del terreno, più o meno imbottita con piume e materiale vegetale. Mentre la femmina incuba le uova, il maschio rimane isolato o forma piccoli branchi con altri soggetti dello stesso sesso. La cova comincia, a seconda del clima, dai primi di maggio a tutto giugno e dura da 24 a 26 giorni a deposizione ultimata. Una sola covata annuale, formata da 6 - 18 uova. Le uova sono grandi circa 43 x 31 mm, di color argilla

La coturnice

Scritto da Gianluca Paoni

pallido, con puntini e macchie rosso brune. Gli uccelli nati sono in grado di volare dopo circa 25/30 giorni dalla nascita.